

Vážení čtenáři, předložený autodidaktický test ověří, jak pečlivě jste pročetli publikované články. Test se skládá ze 12 otázek, na každou existuje alespoň jedna správná odpověď, řešení najdete v jeho závěru. Přejeme Vám hodně zábavy a především pocit uspokojení z výsledku.

1 Při stanovení stagingu karcinomu pankreatu jsou prováděna následující vyšetření, podle kterých je multidisciplinárním týmem vybrána nejvhodnější terapie:

- a) CT a angiografie
- b) CT (MR), ERCP a endosonografie s FNAB (při lokalizaci v hlavě slinivky)
- c) abdominální ultrasonografie, ERCP a PET
- d) CT (MR) a endosonografie s FNAB (při lokalizaci v těle a ocasu slinivky)

2 Radikální resekční výkon při karcinomu slinivky:

- a) signifikantně prodlužuje život pacienta
- b) dává šanci nemocnému na 5leté přežívání v rozmezí 11–28 %
- c) musí být doplněn o standardní lymfadenektomii
- d) bývá až u 60 % pacientů komplikován při mortalitě nepřevyšující 3–5 %

3 Elektivní provedení totální pankreatektomie u nemocného s karcinomem pankreatu:

- a) nebývá doporučováno
- b) bývá doporučováno při lokalizaci karcinomu v ocase slinivky
- c) bývá doporučováno pro absenci pankreatikojunoanastomózy
- d) bývá v poslední době doporučováno pro zvýšení onkologické radikality

4 Adjuvantní chemoterapie po provedení R0 resekce u nemocného s karcinomem pankreatu:

- a) se podává pouze těm nemocným, u kterých byla zjištěna metastáza v játrech
- b) signifikantně zvyšuje přežití nemocného
- c) signifikantně zlepšuje kvalitu života nemocného
- d) život nemocného signifikantně neprodlužuje

5 Jaká je incidence karcinomu pankreatu v ČR?

- a) 10/100 000
- b) 18/100 000
- c) 5/100 000
- d) 20/100 000

6 Nejdůležitějším prognostickým faktorem je:

- a) stav postižení lymfatických uzlin
- b) kouření
- c) obezita
- d) diabetes

7 Ve stadiu I je čtyřleté přežívání v souboru prezentujících:

- a) 100 %
- b) 60 %
- c) 35 %
- d) 2 %

8 Která z léčebných modalit může být u karcinomu pankreatu kurativní?

- a) chirurgická resekce
- b) chemoterapie
- c) radioterapie
- d) biologická léčba

9 Incidence karcinomu pankreatu je u nás stále na mírném vzestupu. Jaká je současná incidence karcinomu pankreatu v naší republice?

- a) 12/100 000
- b) 15/100 000
- c) 18/100 000
- d) 21/100 000

10 Průměrná doba přežití od stanovení diagnózy karcinomu pankreatu je:

- a) bez chirurgické intervence nebo při paliativním chirurgickém výkonu je to 4–6 měsíců
- b) bez chirurgické intervence nebo při paliativním chirurgickém výkonu 12–16 měsíců
- c) po radikální chirurgické resekcí 2–3 roky
- d) po radikální chirurgické resekcí 11–18 měsíců

11 Radikální resekci neuroendokrinního nádoru pankreatu lze indikovat:

- a) u T2 nádoru
- b) u T3 nádoru
- c) u T2 nádoru se solitární jaterní metastázou 2. segmentu
- d) u nádoru infiltrujícího horní mezenterickou žílu

12 Nejčastějším typem neuroendokrinního nádoru pankreatu je?

- a) inzulinom
- b) gastrinom
- c) glukagonom
- d) somatostatinom

Správné odpovědi: 1. b, d 2. a, b, c, d 3. a 4. b 5. b 6. a 7. c 8. a 9. c 10. a, d 11. a, b, c, d 12. a