

Vážení čtenáři, na stránkách Onkologie se v každém čísle setkáváte s autodidaktickým testem, který ověří, jak pečlivě jste pročetli publikované články. Test se skládá z 10 otázek, na každou existuje alespoň jedna správná odpověď, řešení najdete na jeho konci. Přejeme Vám hodně zábavy a především pocit uspokojení z výsledku.

1 Z následujících tvrzení o kolorektálním karcinomu v ČR je pravdivé:

- a) mortalita je v posledních letech stabilizovaná
- b) incidence v posledních letech stoupá
- c) incidence je vyšší u mužů než u žen
- d) nejčastější věk diagnózy je v 40–49 let

2 Které z následujících tvrzení je nepravdivé:

- a) kolorektální karcinom je genetické onemocnění
- b) chromozomální instabilita je detekovatelná u < 10 % sporadických KRK
- c) karcinogeneze pilovitého adenomu je spojena s hypermethyací CpG ostrůvků
- d) nejvýznamnější rizikový faktor sporadického KRK je věk

3 Screeningový program KRK v ČR:

- a) je založen pouze na testech na okultní krvácení do stolice (TOKS)
- b) primární screeningová kolonoskopie je nabízena od 55 let věku
- c) většina kolorektálních neoplazií je diagnostikována v levém tračniku
- d) krvácení při endoskopické polypektomii je relativně vzácné (< 1 %)

4 Náhlá příhoda břišní je v České republice prvním příznakem nádorového onemocnění tračniku u:

- a) 5 % pacientů
- b) 15 % pacientů
- c) 25 % pacientů
- d) 35 % pacientů

5 Pokud je onemocnění diseminované s omezením na peritoneum, játra nebo plíce, ale všechna ložiska jsou bezpečně odstranitelná chirurgicky, je:

- a) chirurgická resekce zbytečnou zátěží pro pacienta
- b) ve vybraných případech indikována co nejčasnější chirurgická resekce bez jakékoliv systémové léčby
- c) ve vybraných případech indikována co nejčasnější chirurgická resekce ve spojení s perioperační systémovou terapií (maximálně 3 měsíce neoadjuvance)
- d) indikovaná resekce primárního tumoru, nikoliv však dceřiných ložisek

6 Extrakolické patologie můžeme často zachytit na vyšetření tlustého střeva pomocí:

- a) kolonoskopie
- b) CT kolonografie
- c) MR kolonografie
- d) irrigografie

7 Která metoda vyšetření má nejnižší specifitu a senzitivitu k detekci a posouzení ložiskových lézí jater u pacientů s kolorektálním karcinomem?

- a) nativní ultrazvuk
- b) ultrazvuk s možností aplikace kontrastní látky
- c) CT jater
- d) MR jater

8 Správná tvrzení o radiofrekvenční ablaci jsou:

- a) metoda je vhodná u pacientů odmítajících chirurgickou resekci
- b) medián přežívání pacientů, u kterých byla provedena radiofrekvenční ablace je ve studiích signifikace delší než u pacientů, kteří podstoupili jen chemoterapii
- c) frekvence komplikací je nižší než u chirurgické resekce metastáz
- d) lokální recidiva je ve srovnání s chirurgickou resekce méně častá

9 RFA u pacientů s metastatickým postižením jater kolorektálním karcinomem může být provedeno:

- a) vždy u jakéhokoliv pacienta a jakékoliv velikosti metastázy
- b) RFA se u pacientů s metastázami jater kolorektálního karcinomu neprovádí
- c) místo chirurgické léčby u pacientů, kteří z nějakých důvodů nemohou chirurgickou léčbu absolvovat
- d) v kombinaci s resekcí jater

10 Jaký preparát biologické léčby lze podat v 1. linii do kombinace s chemoterapií u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem?

- a) lze podat bevacizumab nebo cetuximab
- b) lze podat pouze bevacizumab
- c) lze podat pouze cetuximab
- d) nelze podat ani jeden z výše uvedených preparátů

Správné odpovědi: 1. a, c; 2. b; 3. b, c, d; 4. c; 5. c; 6. b, c; 7. a; 8. a, b, c; 9. c, d; 10. a