

Nové možnosti v diagnostice a terapii karcinomu ovaria

Vážení kolegové, přátelé,
zdravíme srdečně z Brna, po úspěšně proběhlém již 48. ročníku Brněnských onkologických dnů. Letos podruhé je hlavním tématem čísla onkogynekologická problematika. Sdělení si pro vás připravil autorský kolektiv lékařů Oddělení gynekologické onkologie v Masarykově onkologickém ústavu v Brně. Vybrali jsme témata rezonující moderní onkogynélogií, začlenili jsme také informace z kongresu Evropské společnosti gynekologické onkologie (ESGO), který se konal v březnu v Barceloně.

Pravděpodobně nekontroverznějším postupem v posledních dvaceti letech je využití intraperitoneální hypertermické chemoterapie navazující na cytoredukční operaci (HIPEC). Právě na letošním kongresu ESGO byly prezentovány výsledky longitudinální prospektivní studie, které usazují tuto velmi specializovanou kombinovanou terapii do léčebného portfolia primárně inoperabilních pacientek s pokročilým karcinomem ovaria, tuby a primárním peritoneálním karcinomem. Vůbec celá proble-

matika karcinomu ovaria je drásající vzhledem k dosud nepoznaným možnostem zachytu časných fází onemocnění. Tomu se věnuje částečně i sdělení o zatím identifikovaných prekursorových lézích především high grade serózního ovariálního karcinomu a deklaruje doporučené postupy při jejich náhodném zachytu při operačních výkonech na vejcovodech z neonkologické indikace.

Karcinom endometria prošel v posledních asi pěti letech nejturbulentnějším procesem ze všech onkogynekologických diagnóz: byly identifikovány molekulární prediktory, které mají jasný přesah do terapeutických postupů, z čehož rezultovala i nutnost změn ve FIGO klasifikačním systému, jež tyto molekulární prediktory implementoval k histopatologickým. Uvedená cesta otevřela možnosti k využití imunoterapie a cílené léčby u karcinomu endometria. Přestože máme všichni inhibitory PARP spojené s udržovací léčbou u karcinomu ovaria, u pokročilého, metastatického, a recidivujícího karcinomu endometria se pravděpodobně budou iPARP využívat v kom-

binované léčbě nejen pro svůj vlastní účinek na inhibici oprav DNA v nádorových buňkách, ale i pro svůj podpůrný účinek k efektu checkpoint inhibitorů. Druhou diagnózou, kde checkpoint inhibitory patří do léčebné strategie, je pokročilý, metastatický a recidivující karcinom čípku děložního.

Poslední sdělení propojuje mateřský obor gynekologie a porodnictví, a formou komentované kazuistiky se pasuje s nočními můrami této specializace: placenta accreta, život ohrožující peripartální krvácení, náhodný nález adenokarcinomu čípku děložního.

Přejeme vám pokud možno krásné dny pravděpodobně historicky nejteplejšího podzimu. A samozřejmě, co by to bylo za zdravici z Moravy bez naděje na jistě historicky nejlepší vinařský ročník.

Na zdraví, přátelé!

Josef Chovanec

Oddělení gynekologické onkologie
Kliniky operační onkologie v Masarykově
onkologickém ústavu v Brně