

AUTODIDAKTICKÝ TEST Č. 3/2008

Máte chuť a snahu ověřit si své znalosti? Chcete se zapojit do celoroční vzdělávací aktivity? Pak právě vám je určen následující autodidaktický test, který je speciálně vytvořen z otázek, které se přímo vztahují k obsahové stránce článků zařazených v tomto čísle časopisu Onkologie. Test se skládá z 12 otázek, přičemž na každou z nich může být jedna, nebo i více správných odpovědí. Správné řešení najdete na konci časopisu.

Test č. 3/2008

1. Po zavedení ATRA do terapie promyelocytární leukemie lze vyléčit:
 - a) 20–30 % nemocných
 - b) 40–50 % nemocných
 - c) 70–80 % nemocných
 - d) všechny nemocné
2. ATRA byla k léčbě nemocných s promyelocytární leukemií poprvé použita:
 - a) v USA
 - b) v Číně
 - c) v ČR
 - d) ve Španělsku
3. Philadelphia chromozóm (Ph):
 - a) vzniká důsledkem reciproční translokace mezi chromozómy 8 a 21
 - b) vzniká důsledkem reciproční translokace mezi chromozómy 9 a 22
 - c) je přítomný výhradně u pacientů s CML
 - d) je spojený s přítomností hyperleukocytózy při diagnóze
4. V BFM protokolech je věkové kritérium pro standardní riziko vymezeno intervalem:
 - a) 1.–9. rokem
 - b) 1.–12. rokem
 - c) 1.–5. rokem
 - d) 1.–18. rokem
5. Nejčastější příčinou úmrtí nemocných s APL je:
 - a) infekce
 - b) krvácení
 - c) sekundární malignita
 - d) ATRA syndrom
6. Dasatinib:
 - a) je lékem 2. linie pro pacienty s CML a Ph+ ALL při rezistenci nebo intoleranci imatinibu
 - b) působí výhradně na inaktivní konformaci Abl kinázy
 - c) nespůsobuje závažné trombocytopenie
 - d) sa podává výhradně intravenózně
7. Hyperdiploidie a TEL/AML1 mutace jsou příznivé prognostické znaky ALL:
 - a) u dospělých pacientů
 - b) u dětských pacientů
 - c) u všech pacientů
 - d) jsou nepříznivé prognostické znaky
8. Bodové mutace v Abl kinázové doméne:
 - a) sú najčastejšou príčinou sekundárnej rezistencie
 - b) ovplyvňujú funkcie membránových transportérov (napr. p-glykoproteínu)
 - c) vznikajú len u pacientov, ktorí sú liečení imatinibom
 - d) diagnostikujeme pomocou cytogenetických metód
9. Hyperdiploidie >50 chromozomů je numerická cytogenetická změna u:
 - a) 50 % dětských pacientů
 - b) 10 % dětských pacientů
 - c) 25 % dětských pacientů
 - d) 40 % dětských pacientů
10. Příčinou krvácivých projevů u APL je:
 - a) konsumpční koagulopatie
 - b) excesivní fibrinolýza
 - c) trombocytopenie
 - d) vše výše uvedené
11. Časná odpověď na léčbu ALL je:
 - a) nepříznivý prognostický znak
 - b) nevýznamný prognostický znak
 - c) významný příznivý prognostický znak
 - d) intermediární prognostický znak
12. Medzi tzv. duálne inhibítory Abl/Src kináz patrí:
 - a) dasatinib
 - b) interferón α
 - c) bortezomib
 - d) imatinib