

Vážení čtenáři, předložený autodidaktický test ověří, jak pečlivě jste pročetli publikované články. Test se skládá ze 12 otázek, na každou existuje alespoň jedna správná odpověď, řešení najdete v jeho závěru. Přejeme Vám hodně zábavy a především pocit uspokojení z výsledku.

1 Kdy je indikována pooperační radioterapie u karcinomu prsu?

- a) vždy
- b) vždy po parciálním výkonu na prsu
- c) u pacientek mladších 35 let
- d) při nedostatečné vzdálenosti chirurgického řezu od nádoru

2 Kdy ozařujeme spádové lymfatické uzliny ?

- a) vždy
- b) vždy při postižení lymfatických uzlin
- c) při postižení 4 a více lymfatických uzlin
- d) při extrakapsulárním šíření nádoru v lymfatické uzlině

3 K ovlivnění silné bolesti při orofaryngeální mukozitidě jsou nejvhodnější:

- a) opioidy
- b) ibuprofen nebo paracetamol
- c) roztok s lokálními anestetiky
- d) fyziologický roztok

4 Nejlepším prediktivním markerem odpovědi na neoadjuvantní chemoterapii je:

- a) typ non-lobulární karcinom
- b) vysoký grade
- c) negativita hormonálních receptorů
- d) overexprese HER-2

5 Mezi časné komplikace po ozáření nepatří:

- a) erytém
- b) vlhká deskvamace
- c) teleangiektázie
- d) plicní fibróza

6 Paliativní radioterapie u karcinomu prsu:

- a) zmírňuje bolesti
- b) vede ke zpevnění kostní struktury v případě osteolytické metastázy
- c) prodlužuje přežití
- d) užívá se sporadicky

7 Přínos v adjuvantní léčbě prokázal z „nových“ cytostatik kromě taxanů:

- a) capecitabin
- b) gemcitabin
- c) vinorelbin
- d) žádné cytostatikum

8 Kombinace LHRH analogů v kombinaci s inhibitory aromatázy v adjuvantní léčbě u premenopauzálních pacientek se doporučuje v případě:

- a) overexprese HER-2
- b) negativity progesteronového receptoru
- c) kontraindikace k tamoxifenu
- d) vysokého rizika relapsu

9 Sentinelová uzlina je:

- a) zvětšená uzlina v levé podklíčkové krajině
- b) první drenážní filtr, schopen zadržet buňky nádorové populace
- c) uzlina větší jako 2 cm v oblasti mediastina
- d) pohyblivá uzlina v oblasti třísel

10 Při léčbě dyskomfortu a bolesti orofaryngeální mukozitidy:

- a) jsou základním lékem opioidy
- b) musí být vždy podána systémová analgetika
- c) jsou ideální nesteroidní antirevmatika
- d) dodržujeme individuální a výstavbový přístup

11 Základem péče při orofaryngeální mukozitidě jsou:

- a) růstové faktory keratinocytů
- b) výplachy dutiny ústní a kloktání
- c) aplikace tramadolu a opioidů
- d) aplikace ledové tříště

12 Při léčbě bolesti opioidy je nutné:

- a) sledovat efekt léčby
- b) sledovat nežádoucí účinky
- c) dodržovat pravidla nakládání s opioidy
- d) platí vše výše uvedené

Správné odpovědi: 1. b, d, 2. c, d, 3. a, 4. c, 5. c, d, 6. a, b, 7. d, 8. c, 9. b, 10. d, 11. b, 12. d