

Milí čtenáři,

před lety jsem se zúčastnila semináře v Praze ještě v bývalém hotelu Atrium, kde jsme byli seznamováni s novým antiemetikem, které mělo výrazně zlepšit komfort nemocných léčených chemoterapií. Jednalo se o preparát Zofran. V diskuzi z našich řad zaznělo, že tento lék nemůžeme našim pacientům poskytnout. Pochopitelně z finančních důvodů. Odpovědí zahraničního přednášejícího bylo nechápavé pokrčení rameny. Dnes již jde o preparát základní a běžně používaný.

Medicína jde nezádržitelně kupředu. Nabízejí se nové diagnostické i terapeutické postupy, další generace cytostatik, cílená léčba moderními preparáty, zpřesnění radio-terapeutické léčby specializovanými přístroji a další. Na druhé straně je omezená možnost financování, kterou známe a se kterou se všichni zúčastnění potýkáme.

Osobně dobře chápu netrpělivost i požadavky pacientů, kteří jsou v různých médiích i odborných časopisech podrobně informováni o možnostech léčby, ale zatím ji nemohou dostat. Chci být optimistkou a věřit, že časem dojde i u dalších preparátů ke stejné změně jako u zmíněného antiemetika.

Tento časopis bude distribuován při příležitosti 17. jihočeských onkologických dnů. Na akci, která má po řadu let své pevné místo v kalendáři onkologů i sponzorů. Snahou organizátorů jihočeských onkologických dnů je a vždy bylo, aby účastníci odjízďeli spokojeni a obohaceni o nové poznatky.

Odborným tématem letošního ročníku jsou nádory děložního čípku, děložního těla a vaječníku. Jedná se o nádory, které dle statistické ročenky ÚZIS ČR v roce 2007 postihly 3 848 žen a 1 323 žen na ně umřelo. Nejvyšší úmrtnost mají pochopitelně nádory vaječníku, které jsou často zjištěny až v pokročilých stadiích.

Co se týká diagnostiky a léčby všech tří gynekologických nádorů, došlo v průběhu let k dílčím pokrokům, např. zkvalitnily se ultrazvukové přístroje, využívá se možnosti magnetické rezonance i PET/CT, dále jsou upřesňovány standardy chirurgické léčby, včetně fertilitu zachovávajících postupů. V onkologii je v indikovaných případech využívána konkomitantní chemoradioterapie, rozšířilo se spektrum cytostatik pro léčbu relapsů, probíhají studie s cílenou léčbou atd.

Přes všechny pokroky však stále platí, že pokud je onemocnění diagnostikováno včas, je vyšší šance na trvalé vyléčení. Slovo „včas“ je míněno nejenom ze strany pacientky, ale i z diagnostických možností a umu lékařů.

U nádoru děložního čípku ale existuje i možnost přijít dříve než „včas“, tím je méně na preventivní vakcinace mladých dívek proti HPV. Přesto, že podle mého názoru jde o zásadní změnu v pohledu na tuto chorobu, není hrazena z prostředků zdravotního pojištění...

Na závěr přeji každému, kdo se osobně setká s malignitou, aby ji měl zjištěnou VČAS a mohl být léčen tam, kde je dostatečné technické a odborné personální zázemí.

MUDr. Hana Šíffnerová, Ph.D.

---

**MUDr. Hana Šíffnerová, Ph.D.**

Onkologické oddělení Nemocnice České Budějovice  
B. Němcové 54, 370 87 České Budějovice  
siffnerova@nemcb.cz

---