

INDIKACE

Nemalobuněčný karcinom plic (NSCLC)

Spinocelulární karcinom kůže (CSCC)

Bazocelulární karcinom (BCC)

Karcinom děložního hrdla (CC)



- Přípravek **LIBTAYO** je v **monoterapii** indikován v **první linii léčby dospělých pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC)** exprimujícím PD-L1 (u ≥ 50 % nádorových buněk), bez aberací EGFR, ALK nebo ROS¹, kteří mají **lokálně pokročilý NSCLC** a nejsou vhodní k definitivní chemoradiaci, nebo **metastazující NSCLC**.
- Přípravek **LIBTAYO** je v **kombinaci** s chemoterapií na bázi platiny indikován v první linii léčby **dospělých pacientů s NSCLC** exprimujícím PD-L1 (u ≥ 1 % nádorových buněk) bez aberací EGFR, ALK nebo ROS1, kteří mají: **lokálně pokročilý NSCLC** a nejsou vhodní k definitivní chemoradiaci, nebo **metastazující NSCLC**.
- Přípravek **LIBTAYO** je v **monoterapii** indikován k léčbě dospělých pacientů s **metastazujícím nebo lokálně pokročilým spinocelulárním karcinomem kůže** (mCSCC nebo laCSCC), kteří nejsou vhodní ke kurativní operaci či kurativnímu ozařování.¹
- Přípravek **LIBTAYO** je v **monoterapii** indikován k léčbě dospělých pacientů s **lokálně pokročilým nebo metastazujícím bazocelulárním karcinomem** (laBCC nebo mBCC), u kterých došlo k progresi nebo k intoleranci inhibitoru signální dráhy Hedgehog (HHI).¹
- Přípravek **LIBTAYO** je v **monoterapii** indikován k léčbě dospělých pacientek s **rekurentním nebo metastazujícím karcinomem děložního hrdla** a progresí onemocnění v průběhu chemoterapie na bázi platiny nebo po této chemoterapii.

1. SPC Libtayo, datum revize textu 24. 3. 2023, www.sukl.cz

MAT-CZ-2300605-1.0-06/2023

Určeno pro odbornou veřejnost

SPC Libtayo je nedílnou součástí výstavního stánku