

STANDARD 2. LINIE LÉČBY METASTATICKÉHO KARCINOMU PANKREATU¹



UNIKÁTNÍ PEG-LIPOZOMÁLNÍ FORMA - SILNĚJŠÍ INHIBICE NÁDOROVÉHO RŮSTU²⁻⁵ DOPORUČENO VŠEMI STĚŽEJNÍMI GUIDELINES⁶⁻¹³

Účinná léčba metastazujícího adenokarcinomu pankreatu v kombinaci s 5-FU/LV u dospělých pacientů, u kterých došlo k progresi po léčbě založené na gemcitabinu¹

LITERATURA:

1. ONIVYDE pegylated liposomal SPC. Poslední revize textu 08/2022. **2.** Lamb YN, Scott LJ. Drugs. 2017;77:785–792. **3.** Drummond DC et al. Cancer Res 2006;66:3271–3277. **4.** Kalra AV et al. Cancer Res. 2014;74:7003–7013. **5.** Carnevale J, Ko AH. Future Oncol. 2016;12:453–464. **6.** eUpdate -Cancer of the Pancreas Treatment Recommendations. Published: 15 March 2019. ESMO Guidelines Committee. Available at: <https://www.esmo.org/guidelines/guidelines-by-topic/gastrointestinal-cancers/pancreatic-cancer/eupdate-cancer-of-the-pancreas-treatment-recommendations>. Last accessed: December 2022. **7.** Ducreux M et al. Ann Oncol. 2015;25(suppl5):v56–v68. **8.** Tempero MA et al. J Natl Compr Canc Netw. 2021;19(4):439–457. **9.** Sohal D et al. J Clin Oncol. 2020;38:3217–3230. **10.** Okusaka T et al. Pancreas. 2020;49:326–335. **11.** Cui J et al. Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO). J Natl Cancer Cent. 10.1016/j.jncc.2022.08.006. **12.** National Health Commission of the People's Republic of China. Chin J Cancer Res. 2022;34(3):238–255. **13.** Modrá kniha – 29. aktualizované vydání.