

končení chemoterapie v zavedeném režimu v rozsahu 3–4 sérií dle tolerance s následným přešetřením a v případě kompletní odpovědi na léčbu (complete response, CR) dle RECIST 1.1 byla doporučena maintenance terapie PARPi. Vzhledem k výsledku genetické testace a negativní BRCA mutaci byla provedena ještě somatická testace z tkáně. V karcinosarkomu pravostranných adnex nebyla prokázána pa-

togenní varianta genu BRCA1/BRCA2, proto byla zahájena maintenance terapie přípravkem Zejula 200 mg denně. Remise omenocnění u pacientky trvá.

Závěr

HIPEC reprezentuje nadějnou komplexní volbu u selektovaných pacientek s pokročilým ovariálním karcinomem, a to ve spojení s cyto-

reduktivním výkonem. Je ale potřeba individuálním onkologickým přístupem zhodnotit rozsah onemocnění a rozhodnout, zda je tato metoda léčby vhodná pro danou pacientku se zvážení výhod a rizik s tím spojených. Tak jak se výzkum rozvíjí, stoupá v současnosti význam HIPEC v léčbě ovariálního karcinomu a přináší tak naději pro pacientky s limitovanými možnostmi léčby.

LITERATURA

1. Vergote I, du Bois A, Amant F, et al. Neoadjuvant chemotherapy in advanced ovarian cancer: On what do we agree and disagree? *Gynecol Oncol.* 2013;128(1):6-11. doi: 10.1016/j.jgygno.2012.09.013. Epub 2012 Sep 21. PMID: 23006973.
2. Bhatt A, Glehen O, Zivanovic O, et al. The 2022 PGOI International Consensus on HIPEC Regimens for Peritoneal Malignancies: Epithelial Ovarian Cancer. *Ann Surg Oncol.* 2023;30(13):8115-8137. doi: 10.1245/s10434-023-13932-3. Epub 2023 Aug 10. PMID: 37561343.
3. van Driel WJ, Koole SN, Sikorska K, et al. Hyperthermic Intraperitoneal Chemotherapy in Ovarian Cancer. *N Engl*

- J Med.* 2018;378(3):230-240. doi: 10.1056/NEJMoa1708618. PMID: 29342393.
4. Spriggs DR, Zivanovic O. Ovarian Cancer Treatment - Are We Getting Warmer? *N Engl J Med.* 2018;378(3):293-294. doi: 10.1056/NEJMe1714556. PMID: 29342385.
5. Aronson SL, Lopez-Yurda M, Koole SN, et al. Cytoreductive surgery with or without hyperthermic intraperitoneal chemotherapy in patients with advanced ovarian cancer (OVHIPEC-1): final survival analysis of a randomised, controlled, phase 3 trial. *Lancet Oncol.* 2023;24(10):1109-1118. doi: 10.1016/S1470-2045(23)00396-0. Epub 2023 Sep

11. PMID: 37708912.
6. Lim MC, Chang SJ, Park B, et al. Survival After Hyperthermic Intraperitoneal Chemotherapy and Primary or Interval Cytoreductive Surgery in Ovarian Cancer: A Randomized Clinical Trial. *JAMA Surg.* 2022;157(5):374-383. doi: 10.1001/jamasurg.2022.0143. PMID: 35262624; PMCID: PMC8908225.
7. Chan JK, Brady MF, Penson RT, et al. Weekly vs. every-3-week paclitaxel and carboplatin for ovarian cancer. *New England Journal of Medicine.* 2016;374(8):738-748. doi: 10.1056/NEJMoa1516217.

Tip na dárek pro zdravotníky

Potěšte své přátele a blízké z řad lékařů či farmaceutů předplatným některého z časopisů vydavatelství SOLEN.

- ČESKÁ A SLOVENSKÁ FARMACIE
- DERMATOLOGIE PRO PRAXI
- MEDICÍNA PRO PRAXI
- NEUROLOGIE PRO PRAXI
- ONKOLOGIE
- PEDIATRIE PRO PRAXI
- PSYCHIATRIE PRO PRAXI
- UROLOGIE PRO PRAXI
- VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ



Pro obdarovaného si vytisknete dárkový certifikát.



NÁVOD, JAK
POSTUPOVAT

