

HLAVNÍ TÉMA

INTERSTICIÁLNÍ HDR BRACHYTERAPIE NÁDORŮ PENISU

léčby, poté jsou sledováni v 3 měsíčních intervalech první 3 roky, a 6 měsíců další dva roky a následně 1× ročně za pravidelných kontrol v onkologické i urologické ambulanci.

LITERATURA

1. Misra S, Chaturvedi A, Misra NC. Penile carcinoma: a challenge for the developing World. *Lancet Oncol.* 2004; 5(4):240-247.
2. Mosconi AM, Roila F, Gatta G, et al. Cancer of the penis. *Crit Rev Oncol Hematol.* 2005;53(2):165-177.
3. Douglawi A, Masterson TA. Updates on the epidemiology and risk factors for penile cancer. *Transl Androl Urol.* 2017;6(5):785-790.
4. Barnholtz-Sloan JS, Maldonado JL, Pow-sang J, et al. Incidence trends in primary malignant penile cancer. *Urol Oncol Semin Orig Investig.* 2007;25(5):361-367.
5. Büchler T. In: Speciální onkologie. Praha: Maxdorf, s.r.o.; 2020.

Závěr

HDR-BRT v léčbě časných karcinomů penisu je alternativou chirurgického zákroku u dobře selektovaných pacientů. Důležitou výhodou je možnost zachování orgánu, která

vede k lepší kvalitě života, zlepšení psychiky a zachování sexuálních funkcí. V případě recidivy je stále v záloze provedení záchranné chirurgické léčby, přičemž tento léčebný postup nezhoršuje celkové přežití pacientů.

6. Maddineni SB, Lau MM, Sangar VK. Identifying the needs of penile cancer sufferers: A systematic review of the quality of life, psychosexual and psychosocial literature in penile cancer. *BMC Urol.* 2009;9(1):8.
7. Korzeniewski MA, Crook JM. Contemporary role of radiotherapy in the management of penile cancer. *Transl Androl Urol.* 2017;6(5):855-867.
8. Pohanková D, Širák I, Vošmik M, et al. High-Dose-Rate Brachytherapy as an Organ-Sparing Treatment for Early Penile Cancer. *Cancers.* 2022;14(24):6248.
9. Petera J, Širák I, Kašáková L, et al. High-dose rate brachytherapy in the treatment of penile carcinoma—first experience.

Brachytherapy. 2011;10(2):136-140. <https://doi.org/10.1016/j.brachy.2010.05.007>.

10. Martz N, Bodokh Y, Gautier M, et al. High-dose rate brachytherapy in localized penile cancer: 5-Year clinical outcome analysis. *Clin Transl Radiat Oncol.* 2021;27:89-95.
11. Marbán M, Crook J, Keyes M, et al. High-dose-rate brachytherapy for localized penile cancer: Evolution of a technique. *Brachytherapy.* 2020;19(2):201-209.
12. Hasan S, Francis A, Hagenauer A, et al. The role of brachytherapy in organ preservation for penile cancer: A meta-analysis and review of the literature. *Brachytherapy.* 2015;14(4):517-524.

ON-LINE KURZ

Léčba infantilního hemangiomu II.

OBSAH KURZU

- **Současné a budoucí postupy léčby infantilních hemangiomů**
MUDr. Josef Mališ
- **Case story – adnatní giant hemangioma kalvy a mozku**
MUDr. Vladimíra Sochová
- **Case story infantilní hemangiomu pohledem dermatologa**
MUDr. Dana Prusíková
- **GLUT-1 receptor – pomocník v diagnostice IH**
MUDr. Michaela Murgašová

ODBORNÝ GARANT:

MUDr. Josef Mališ

POŘADATEL:

Společnost Solen, s.r.o.,
ve spolupráci s Klinikou dětské hematologie
a onkologie 2. LF a FN Motol

POČET
KREDITŮ **2**

Registrace
ZDARMA

TERMÍN
prosinec 2023
až listopad 2024
dostupný na
online.solen.cz

ZLATÝ
PARTNER


Pierre Fabre
Médicament

