

do vzniku metastáz 18 a více měsíců od diagnózy (4). Všechny tyto faktory splňuje i náš pacient.

V současné době má trifluridin/tipiracil schválenou rovněž indikaci v kombinaci s bevacizumabem na základě výsledků studie SUNLIGHT, kde byli pacienti randomizováni do dvou ramen – trifluridin/tipiracil a trifluridin/tipiracil s bevacizumabem. Pacienti v rameni s bevacizumabem dosáhli prodloužení OS o více než tři měsíce (mOS 7,5 měsíce oproti mOS 10,8 měsíců) (5). U uvedeného pacienta

nebyla tato kombinace v době zahájení léčby ještě schválena, zároveň pro opakované krvácení z konečníku při krátké terapii afliberceptem v předchozí linii jsme ani posléze o terapii s antiVEGF protilátkou neuvažovali.

Závěr

Na výše uvedeném případě demonstrujeme, že pacienti s pokročilým kolorektálním karcinomem mohou dosáhnout dlouhodobé stabilizace onemocnění a prodloužení celkového přežití. Trifluridin/tipiracil je perorální

cytostatikum, které zlepšuje výsledky léčby pacientů s kolorektálním karcinomem bez negativního dopadu na kvalitu života. To často dovoluje při progresi onemocnění pokračovat v další onkologické terapii. Na dokreslení pozitivního vlivu na našeho pacienta: pro dobrou kvalitu života tohoto nemocného svědčí mimo jiné i to, že je možné ho potkat prakticky každý den v nemocniční jídelně, která je otevřená i pro veřejnost. Je vdovec, dcera bydlí v Plzni. Návštěvu kantýny má nejen jako zdroj teplého jídla, ale také společenskou událost.

LITERATURA

1. Robert JM, Van Cutsem E, Falcone A, et al. Randomized Trial of TAS-102 for Refractory Metastatic Colorectal Cancer. *N Engl J Med*. 2015;372:1909-1919.
2. Available from: <https://www.linkos.cz/lekar-a-multidisiplinarni-tym/personalizovana-onkologie/modra-kniha-cos/aktualni-vydani-modre-knihy/asd-4-zhoubny-novotvar-kolorekta-c18-20/>.

3. Yoshino T, Cleary JM, Van Cutsem E, et al. Neutropenia and survival outcomes in metastatic colorectal cancer patients treated with trifluridine/tipiracil in the RECOURSE and J003 trials. *Annals of Oncology*. *Ann Oncol*. 2020;31(1):88-95. doi: 10.1016/j.annonc.2019.10.005. PMID: 31912801; PMCID: PMC7491979.
4. Taberero J, Argiles G, Sobrero AF. Effect of trifluridine/tipiracil


in patients treated in RECOURSE by prognostic factors at baseline: an exploratory analysis. *ESMO Open*. 2020;5(4):e000752. doi: 10.1136/esmoopen-2020-000752. PMID: 32817131; PMCID: PMC7440836.

5. Prager GW, Taieb J, Fakih M, et al. Trifluridine-Tipiracil and Bevacizumab in Refractory Metastatic Colorectal Cancer. *N Engl J Med*. 2023;388:1657-1667.

Tip na dárek pro zdravotníky

Potěšte své přátele a blízké z řad lékařů či farmaceutů předplatným některého z časopisů vydavatelství SOLEN.

- ČESKÁ A SLOVENSKÁ FARMACIE
- DERMATOLOGIE PRO PRAXI
- MEDICÍNA PRO PRAXI
- NEUROLOGIE PRO PRAXI
- ONKOLOGIE
- PEDIATRIE PRO PRAXI
- PSYCHIATRIE PRO PRAXI
- UROLOGIE PRO PRAXI
- VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ



Pro obdarovaného si vytisknete dárkový certifikát.



NÁVOD, JAK
POSTUPOVAT



<https://www.solen.cz/artkey/inf-990001-2800.php>