

DOSÁHNĚTE NA VÍCE MOŽNOSTÍ LÉČBY



NSCLC
STADIUM
III

STUDIE PACIFIC

HRAZENO³

24,9
měsíce mPFS*⁴

V monoterapii k léčbě dospělých pacientů s lokálně pokročilým, neoperovatelným NSCLC exprimujícím PD-L1 na $\geq 1\%$ nádorových buněk, u kterých nedošlo k progresi onemocnění po konkomitantní chemoradiační léčbě na bázi platiny¹



NSCLC
1. LINIE

STUDIE POSEIDON

**VÍCE NEŽ
DVOJNÁSOBNÁ**
míra 5letého OS
15,7 % vs. 6,8 %⁶

V kombinaci s tremelimumabem a chemoterapií na bázi platiny k léčbě první linie u dospělých pacientů s metastatickým NSCLC bez senzibilujících mutací EGFR nebo přítomnosti mutací ALK^{1,2}

IMFINZI®
durvalumab
Injekce k intravenóznímu použití 50 mg/ml

IMJUDO®
tremelimumab
Injekce k intravenóznímu použití 20 mg/ml



SCLC
1. LINIE

STUDIE CASPIAN

HRAZENO³

3× VÍCE
pacientů přežívá
po 3 letech
17,6 % vs. 5,8 %⁵

V kombinaci s etoposidem a platinou v první linii léčby dospělých pacientů s ES-SCLC¹