

toxicitou převážně v oblasti tváře a nechutenstvím, bez dalších významnějších nežádoucích účinků. Jednalo se o drob-

nou pacientku s nízkou tělesnou hmotností, dávka osimertinibu proto u ní byla z důvodu kožních nežádoucích účinků snížena.

Během terapie došlo ke klinickému zlepšení stavu, restaging je plánován po 3 měsících terapie.

LITERATURA

1. Planchard D, Jänne PA, Cheng Y, et al. FLAURA2 Investigators. Osimertinib with or without Chemotherapy in EGFR-Mutated Advanced NSCLC. *N Engl J Med.* 2023;389(21):1935-1948.
2. SPC Tagrisso. Available from: www.sukl.cz.
3. Cross DA, Ashton SE, Ghiorghiu S, et al. AZD9291, an irreversible EGFR TKI, overcomes T790M-mediated resistance to EGFR inhibitors in lung cancer. *Cancer Discov.* 2014;4(9):1046-1061.
4. Zhang C, Xu C, Gao X, et al. Platinum-based drugs for cancer therapy and anti-tumor strategies. *Theranostics.* 2022;12(5):2115-2132.
5. Ye LY, Sun LX, Zhong XH, et al. The structure of blood-tumor barrier and distribution of chemotherapeutic drugs in non-small cell lung cancer brain metastases. *Cancer Cell Int.* 2021;21(1):556.
6. Zimmermann S, Dziadziuszko R, Peters S. Indications and limitations of chemotherapy and targeted agents in non-small cell lung cancer brain metastases. *Cancer Treat Rev.* 2014;40(6):716-722.
7. Planchard D, Janne PA, Cheng Y, et al. 512MO FLAURA 2: safety and CNS outcomes of first-line osimertinib ± chemotherapy in EGFR advanced NSCLC. *Annals of Oncology.* 2023;34 (suppl_4):S1661-S1706.
8. Planchard D, Jänne PA, Cheng Y, et al. FLAURA2 Investigators. Osimertinib with or without Chemotherapy in EGFR-Mutated Advanced NSCLC. *N Engl J Med.* 2023;389(21):1935-1948 (supplementary appendix).
9. NCCN Guidelines. Non-Small Cell Lung Cancer. version 1.2024. Available from: <https://www.nccn.org/guidelines/guidelines-detail?category=1&id=1450>.
10. Modrá kniha České onkologické společnosti (2024). Brno, Masarykův onkologický ústav; 2024.