

NEJVYŠŠÍ DÁVKA EPA A BÍLKOVIN V NEJMENŠÍM OBJEMU¹



36 g^{*}
Kvalitních
bílkovin

Pomáhá pokrýt
zvýšené proteinové cíle
onkologického pacienta
v souladu s ESPEN
a ESMO guidelines ^{2,3}

2,2 g^{*}
EPA

Imunomodulační
účinek cílený
na systémový zánět ⁴⁻⁶

20 µg^{*}
Vitamín D

Pomáhá při zvýšené
prevalenci deficitu
vitamínu D
u onkologických
pacientů ²

* Při doporučené dávce 2 lahviček denně k doplnění běžné stravy.

ONS25PHAONC26CZ I Forticare Advanced je potravina pro zvláštní lékařské účely pro řízenou dietní výživu při podvýživě nebo riziku podvýživy u onkologických pacientů, při kachexii nebo chronickém metabolickém onemocnění. Určeno k užívání pod dohledem lékaře. **Reference:** 1. Pseudoreferenční skupina přípravků: V06/34 - enterální výživa se zvýšeným obsahem omega-3-polynenasycených mastných kyselin. <https://sukl.gov.cz/ceny-a-uhrady-leciv/seznam-leciv-a-pzlu-hrazenych-ze-zdravotniho-pojisteni/seznam-cen-a-uhrad-lp-pzlu-k-1-7-2025/> 2. Arends J, Bachmann P, Baracos V, et al. ESPEN guidelines on nutrition in cancer patients. Clin Nutr. 2017; 36(1):11-48. 3. Arends J, Strasser F, Gonella S, et al. Cancer cachexia in adult patients: ESMO Clinical Practice Guideline. ESMO Open. 2021 Jun; 6(3):100092. 4. de Luis DA, Izaola O, Cuellar L, et al. Clinical effect of w3 enhanced powered nutritional formula in postsurgical ambulatory head and neck cancer patients. Nutr Hosp. 2013; 28(5):1463-1467 5. Murphy RA, Mourtzakis M, Chu QSC, et al. Nutritional intervention with fish oil provides a benefit over standard of care for weight and skeletal muscle mass in patients with nonsmall cell lung cancer receiving chemotherapy. Cancer. 2011; 115: 1775-1782. 6. Pappalardo G, Almeida A, Ravasco P, et al. Eicosapentaenoic acid in cancer improves body composition and modulates metabolism. Nutrition. 2015 Apr; 31(4):549-555.



Infolinka: 800 110 001
(Po-Pá 8:30-16:00)

www.e.nutricia.cz
www.nutridrink.cz